



# ENTEROSGEL®

Preparat de detoxifiere

Adsorbant gastrointestinal pentru utilizare în caz de diaree acută sau în caz de sindrom de colon iritabil cu diaree

## CE INFORMAȚII GĂSIȚI ÎN ACEST PROSPECT

1. Ce este ENTEROSGEL® și pentru ce se utilizează
2. Ce trebuie să știți înainte să începeți să utilizați ENTEROSGEL®
3. Cum să luați ENTEROSGEL®
4. Reacții adverse posibile
5. Cum se păstrează ENTEROSGEL®
6. Conținutul ambalajului și alte informații

## 1. CE ESTE ENTEROSGEL® ȘI PENTRU CE SE UTILIZEAZĂ

**ENTEROSGEL® este o suspensie perorală indicată pentru:**

- tratamentul simptomatic al diareei acute,
- sindromul intestinului iritabil cu diaree SII-D.

ENTEROSGEL® este un adsorbant intestinal oral (enterosorbent) bazat pe un mineral cu capacitate de adsorbție la unele substanțe toxice și nocive din intestin (de ex. endotoxine, enterotoxine) pe care le leagă fizic pe suprafața sa, putând astfel reduce frecvența scaunelor și durata diareei.

ENTEROSGEL® se elimină din organism prin scaun și astfel elimină toxinele adsorbite și substanțele nocive, lucru ce poate avea un efect benefic în tratarea afecțiunilor indicate.

ENTEROSGEL® calmează diareea, durerile abdominale, balonarea și nevoia de defecare la pacienții cu SII-D.

ENTEROSGEL® nu conține conservanți, gluten, zahăr, îndulcitori, lactoză, grăsimi, arome artificiale, ingrediente de origine vegetală sau animală.

## 2. CE TREBUIE SĂ ȘTIȚI ÎNAINTE SĂ ÎNCEPEȚI SĂ UTILIZAȚI ENTEROSGEL®

**A nu se administra ENTEROSGEL® (contraindicații):**

- Dacă luați simultan medicamente pe cale orală cu eliberare modificată (controlată).
- În cazul în care suferiți suferiți de atonie intestinală sau de ocluzie intestinală (de constipație gravă din motive de ocluzie intestinală).
- În cazul intoleranței la administrarea preparatului în trecut.

### Avertismente și măsuri preventive

- A nu se lua ENTEROSGEL® cu cel puțin două ore înainte sau după administrarea pe cale orală a medicamentului. ENTEROSGEL® poate afecta absorbția unor medicamente care se administrează pe cale orală. Dacă luați anumite medicamente, vă puteți consulta, de asemenea, cu medicul dumneavoastră sau cu farmacistul despre administrarea preparatului ENTEROSGEL®.
- În cazul diareei de lungă durată, este necesar să consultați un medic înainte de a lua preparatul ENTEROSGEL® pentru a stabili un diagnostic al bolii de bază.
- La copii, tratamentul diareei trebuie să fie suplimentat prin administrarea

unei cantități suficiente de lichide sau a unei soluții de hidratare perorală, pentru a evita deshidratarea.

- La adulți, în timpul tratamentului cu preparatul ENTEROSGEL® se recomandă consumul de lichide sau o soluție de hidratare perorală pentru a asigura o rehidratare adecvată.
- Nu depășiți durata tratamentului recomandată și nu administrați preparatul împreună cu mâncare pentru a evita o posibilă deficiență de vitamine și de nutrienți.
- Dacă diareea durează mai mult de două zile, este necesar să consultați un medic.
- În cazul în care aveți febră, sânge în scaun, semne de deshidratare, șase sau mai multe scaune în ultimele 24 de ore, în același timp diaree și vărsături, dureri de stomac puternice sau permanente atunci cereți asistență medicală cât mai curând posibil, mai ales atunci când este vorba de copii.
- Nu depășiți doza recomandată și nu depășiți durata recomandată a tratamentului.
- Vă rugăm să consultați medicul dumneavoastră dacă la ora actuală luați și alți adsorbanti intestinali, de exemplu preparate care conțin cărbune activat, argilă sau caolină. Medicul dumneavoastră vă va sfătui ce n-ar trebui să luați împreună cu preparatul ENTEROSGEL®.
- ENTEROSGEL® nu este indicat pentru cazuri de intoxicație chimică acută sau pentru supradozajul medicamentelor.
- A nu se utiliza după data de expirare înscrisă pe ambalaj.

**ENTEROSGEL® poate fi utilizat în timpul sarcinii și alăptării.** Este recomandat să consultați medicul dacă vă simțiți rău în timpul sarcinii sau alăptării. Vă rugăm să consultați medicul dumneavoastră înainte de a lua preparatul ENTEROSGEL®.

## 3. CUM SĂ LUAȚI ENTEROSGEL®

- Luați doza necesară de ENTEROSGEL® după primul scaun moale.
- Luați ENTEROSGEL® cu cel puțin 2 ore înainte sau după administrarea medicamentului peroral.
- Luați ENTEROSGEL® cu cel puțin 1–2 ore înainte sau după masă.
- Înainte de administrare diluați doza în apă la temperatura camerei.
- Folosiți pliculețul imediat după deschidere.
- Agitați bine tubul înainte de deschidere și înainte de fiecare utilizare.
- Folosiți tubul în 30 de zile de la deschidere.



Vârstă	Dozare	Cât de des
<b>Până la 1 an</b>	2,5 g (≈1/2 linguriță) a se dilua în 7,5-15 ml de apă.	de 3 ori pe zi
<b>1–6 ani</b>	5 g (≈1 linguriță) a se dilua în 50-100 ml de apă.	de 3 ori pe zi
<b>7–14 ani</b>	10 g (≈2 lingurițe) a se dilua în 50-100 ml de apă.	de 3 ori pe zi
<b>15+ și adulți</b>	15 g până la 22,5 g (≈1 lingură sau 1–1,5 din plic) a se dilua în 200 ml de apă.	de 3 ori pe zi



# ENTEROSGEL®

Preparat de detoxifiere

## Durata tratamentului cu ENTEROSGEL® este:

- 3–5 zile în caz de diaree acută,
- Până la 30 de zile pentru sindromul de colon iritabil cu diaree. Pauza dintre utilizarea repetată trebuie să fie de cel puțin 3 zile.
- Se recomandă consultarea medicului înainte de utilizare la copiii sub 3 ani.
- La începutul tratamentului (Ziua 1) puteți dubla prima doză și apoi continuați cu o singură doză după fiecare scaun. Maximum opt doze în prima zi.
- În timpul tratamentului diareii cronice puteți adapta dozarea în așa fel încât să corespundă consistenței și frecvenței scaunului. Este posibil să se administreze chiar doză dublă de 3 ori pe zi în cazul în care scaunul este subțire, sau să se reducă la o singură doză o dată pe zi în cazul în care scaunul este normal. Se pot administra maxim 6 doze pe zi.
- Întrerupeți tratamentul cu preparatul ENTEROSGEL® dacă nu aveți scaun timp de 1-2 zile, măriți aportul de apă și continuați tratamentul după un alt scaun.

## 4. REACȚII ADVERSE POSIBILE

Constipație, senzație de greață

## 5. CUM SE PĂSTREAZĂ ENTEROSGEL®

- ENTEROSGEL® nu trebuie să fie utilizat după termenul de expirare indicat pe ambalaj.
- A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
- A se păstra ENTEROSGEL® la temperaturi de la 4 °C până la 30 °C.
- A se feri de îngheț.
- A nu se expune la căldură excesivă și a se feri de razele directe ale soarelui.
- Data expirării indicată pe ambalaj se referă la produsul nedeschis, depozitat în mod corespunzător.

### Plicuțele

- După deschidere, fiecare plic poate fi utilizat numai o singură dată.
- Plicurile sunt de unică folosință și trebuie să se deschidă imediat înainte de utilizare.
- A nu se reutiliza plicurile parțial utilizate ca să evitați contaminarea microbiană

### Tuburi

- După deschidere și după fiecare utilizare închideți bine capacul tubului în așa fel încât să nu se producă uscarea și contaminarea microbiană.

**La stoarcerea preparatului ENTEROSGEL® din tub sau din plic, poate apărea o cantitate mică de lichid.**

## 6. CONȚINUTUL AMBALAJULUI ȘI ALTE INFORMAȚII

**Compoziție:** Polimetilsiloxan polihidrat (hidrogel de acid metilsilicic) – 70 %, apă purificată – 30 %.

### Mărimea ambalajului

- ENTEROSGEL® suspensie perorală
- Tub de 225 g
- Tub de 90 g
- Plic de 15 g (10 plicuri în ambalaj)

### LICHIDARE

Lichidarea preparatului ENTEROSGEL® neutilizat nu este supusă măsurilor speciale. Preparatul poate fi aruncat în siguranță în deșeurile menajere. Ambalajul este reciclabil.

**Perioada de valabilitate:** până la data indicată pe ambalaj

**Dacă aveți alte întrebări suplimentare cu privire la utilizarea preparatului ENTEROSGEL®, adresați-vă vă rog prin e-mail: [info@enterosgel.eu](mailto:info@enterosgel.eu).**

Prezentul prospect este la dispoziție și în alte limbi la [www.enterosgel.eu](http://www.enterosgel.eu).

### PRODUCĂTOR:



Bioline Products s.r.o.  
Krakovská 1338/10,  
110 00 Praha, Republica Cehă  
[www.enterosgel.eu](http://www.enterosgel.eu)












### DISTRIBUITOR:

SC NANO BIO MEDICAL SRL  
Intrarea Armașului,  
nr. 12, ap. 2, sector 1,  
București, România, 010484  
Telefon: 021.210.52.40  
**[office@enterosgel.ro](mailto:office@enterosgel.ro)**  
**[www.enterosgel.ro](http://www.enterosgel.ro)**

**DATA VERSIUNII ACTUALIZATE A PROSPECTULUI:** 08.08.2022

**VERSIUNE:** TUV/IFU/RO/NB/2

### EXPLICAREA SIMBOLURILOR GRAFICE DE PE AMBALAJ:

- |   |  |   |   |
|---|--|---|---|
|    | De unică folosință                     |    | Ambalaj de unică folosință  |
|    | Valabilitatea minimă                   |    | Aruncați ambalajul în containerul de deșeurii corespunzător. Ambalajul este reciclabil. |
| <b>LOT</b>  | Lot                                    |    |   |
|    | Producător                             |   | Taxa pentru compania autorizată de ambalare a fost plătită pentru acest ambalaj.        |
|  | Vă rog să citiți prospectul cu atenție |  | A se ține departe de lumina directă a soarelui.   |
|  | Intervalul de temperaturi              |   |   |
|  | Dispozitiv medical certificat          |   |   |

**CE 0123**

**Dispozitiv medical clasa IIa**